

貯 法：室温保存
有効期間：袋に記載（Exp.Date）

経口腸管洗浄剤

処方箋医薬品^{注)}

ナトリウム・カリウム配合剤

ニフレック 配合内用剤

NIFLEC Combination Powder

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

要約

- ・絶食は前日夕食以降からです。前日は朝・昼・夕の食事を消化の良いメニューにしておくことで下剤が楽になります。
- ・下剤を飲むのは前日夜でも当日朝でも可。当日朝の場合は、起床時間が4時や5時になります。
- ・2リットルの水に溶かして飲みます。
- ・便が透明の状態になれば2リットル全てを服用する必要はありません。下剤の服用を完了してください。



1. 注意

本剤の投与により、腸管内圧上昇による腸管穿孔を起こすことがあるので、排便、腹痛等の状況を確認しながら、慎重に投与するとともに、腹痛等の消化器症状があらわれた場合は投与を中断し、腹部の診察や画像検査（単純X線、超音波、CT等）を行い、投与継続の可否について慎重に検討すること。特に、腸閉塞を疑う患者には問診、触診、直腸診、画像検査等により腸閉塞でないことを確認した後に投与するとともに、腸管狭窄、高度な便秘、腸管憩室のある患者では注意すること。本剤の投与により、ショック、アナフィラキシー等があらわれるおそれがあるので、顔面蒼白、血圧低下、嘔吐、嘔気持続、気分不良、眩暈、冷感、じん麻疹、呼吸困難、顔面浮腫等があらわれた場合には投与を中止し、医療機関へ連絡すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

胃腸管閉塞症及び腸閉塞の疑いのある患者〔腸管穿孔を起こすおそれがある。〕腸管穿孔のある患者〔腹膜炎その他重篤な合併症を起こすおそれがある。〕中毒性巨大結腸症のある患者〔穿孔を引き起こし腹膜炎、腸管出血を起こすおそれがある。〕

3. 組成・性状

3.1 組成

		1 袋包（137.155g）中
有効成分	塩化ナトリウム	2.93g
	塩化カリウム	1.485g
	炭酸水素ナトリウム	3.37g
	無水硫酸ナトリウム	11.37g
添 加 剤	マクロゴール4000（ポリエチレングリコール4000：等張化剤）、サッカリンナトリウム水和物、香料	

3.2 製剤の性状

剤形	色	特徴
粉末	白色～帯黄白色	特異な芳香があり、味はわずかに甘い

4. 効能又は効果

大腸内視鏡検査、バリウム注腸X線造影検査及び大腸手術時の前処置における腸管内容物の排除

5. 用法及び用量

本品1袋を水に溶解して約2Lとし、溶解液とする。
通常、成人には、1時間あたり約1Lの速度で経口投与する。ただし、排泄液が透明になった時点で投与を終了して構わない。


〈大腸内視鏡検査前処置〉

○検査当日に投与する場合：当日の朝食は絶食（水分摂取のみ可）とし、検査開始予定時間の約4時間前から投与を開始する。

○検査前日に投与する場合：前日の夕食後は絶食（水分摂取のみ可）とし、夕食後約1時間以上経過した後、投与を開始する。ただし、前日の朝食、昼食は残渣の少ないもの、夕食は固形物の入っていない液状食とする。

6. 便の状態

約1L服用したころから排便が始まります。排便回数にともない便の状態が①→④のような透明な液体となります。④になれば検査可能です。服用を完了してください。



①初回の便 ②2回目以降 ③僅かに固形 ④僅かに黄色